

くすりのしおり

2002年8月作成

この「くすりのしおり」は医薬品情報の全て、患者さまの病状・病態の全てを網羅したものではありません。最新の添付文書等をご確認いただき、患者さま個々の病態に合わせて加筆・修正の上、ご使用下さい。



この薬の名前は	・商品名:アルサルミン細粒 ・英名:ULCERLMIN Fine Granule ・一般名:スカルファート(sucralfate)	剤形:細粒剤 色:白色 シート裏面の記載:UL C-23C アルサルミン細粒1g(分包のみ)
この薬の働きは	・胃腸の粘膜を保護し、胃・十二指腸潰瘍や胃炎をなおします。	
主治医に伝え忘れたことはありませんか	・次のような人は使う前に主治医に相談して下さい。 薬や食べ物で、発疹などの過敏症を起こしたことがある人 腎臓の病気で透析を受けている人 腎臓の機能に障害がある人 血液中のリン酸塩が低下している人 ・ほかに薬を使っている場合(薬局で買った薬も) そのくすりについて主治医に伝えてください。 ・妊娠または授乳中の場合 主治医にそのことを必ず伝えてください。	
この薬の使い方	・飲み方 必ず指示に従い、飲むときはコップ1杯程度の水またはぬるま湯といっしょに飲んで下さい。 ・飲み忘れた場合 思い出したときにすぐ飲んで下さい。次回からは指示通りに飲んで下さい。 2回分を1度に飲んではいけません。 ・あやまって多く飲んだ場合 すぐに主治医または薬剤師に相談して下さい。 ・高齢者の場合 特に主治医の指示を守って服用して下さい。高齢者の場合は、副作用が起こりやすくなる場合があります。 ・その他 医師の指示なしに薬を飲むのをやめたり、勝手に量を増やしたりしないで下さい。 ・室温で保管して下さい。 ・子どもの手の届かないところに置いて下さい。	
生活上の注意	・この薬を飲んでいる間に他の薬(薬局で買った薬も)を飲むときは、あらかじめ主治医または薬剤師にご相談下さい。	
この薬を飲んだあと気をつけていただくこと(副作用)	・薬は人によって、目的の効果以外に、望ましくない作用が出る場合もあります。 次のような症状に気づいたら、なるべく早めに主治医に相談して下さい。 ・便秘、口が渇く、吐き気など ・発疹、じんましんなどの過敏症状 ・長期にのんでいる人で、どもる、骨が痛い、骨折しやすくなるなど ・他にも何か変だなと感じたら、主治医または薬剤師に相談して下さい。	
その他(コメント)		
問い合わせ先		

*ここには、知っておいて頂きたい主な事柄だけが書いてあります。更にくわしく知りたいときは、主治医または薬剤師におたずねください。

くすりのしおり

2002年8月作成

この「くすりのしおり」は医薬品情報の全て、患者さまの病状・病態の全てを網羅したものではありません。最新の添付文書等をご確認いただき、患者さま個々の病態に合わせて加筆・修正の上、ご使用下さい。

この薬の名前は	・商品名:アルサルミン錠 ・英名:ULCERLMIN Tablets ・一般名:スクラルファート(sucral fate)	剤形:錠剤(直径9.0mm) 色:白色 シート裏面の記載:アルサルミン	 
この薬の働きは	・胃腸の粘膜を保護し、胃・十二指腸潰瘍や胃炎をなおします。		
主治医に伝え忘れたことはありませんか	・次のような人は使う前に主治医に相談して下さい。 薬や食べ物で、発疹などの過敏症を起こしたことのある人 腎臓の病気で透析を受けている人 腎臓の機能に障害がある人 血液中のリン酸塩が低下している人 ・ほかに薬を使っている場合(薬局で買った薬も) そのくすりについて主治医に伝えてください。 ・妊娠または授乳中の場合 主治医にそのことを必ず伝えてください。		
この薬の使い方	・飲み方 必ず指示に従い、飲むときはコップ1杯程度の水またはぬるま湯といっしょに飲んで下さい。 ・飲み忘れた場合 思い出したときにすぐ飲んで下さい。次回からは指示通りに飲んで下さい。 2回分を1度に飲んではいけません。 ・あやまって多く飲んだ場合 すぐに主治医または薬剤師に相談して下さい。 ・高齢者の場合 特に主治医の指示を守って服用して下さい。高齢者の場合は、副作用が起こりやすくなる場合があります。 ・その他 医師の指示なしに薬を飲むのをやめたり、勝手に量を増やしたりしないで下さい。 ・室温で保管して下さい。 ・子ども手の届かないところに置いて下さい。		
生活上の注意	・この薬を飲んでいる間に他の薬(薬局で買った薬も)を飲むときは、あらかじめ主治医または薬剤師にご相談下さい。		
この薬を飲んだあと気をつけていただくこと(副作用)	・薬は人によって、目的の効果以外に、望ましくない作用が出る場合もあります。 次のような症状に気づいたら、なるべく早めに主治医に相談してください。 ・便秘、口が渇く、吐き気など ・発疹、じんましんなどの過敏症状 ・長期にのんでいる人で、どもる、骨が痛い、骨折しやすくなるなど ・他にも何か変だと感じるものがあつたら、主治医または薬剤師に相談して下さい		
その他(コメント)			
問い合わせ先			

*ここには、知っておいて頂きたい主な事柄だけが書いてあります。更にくわしく知りたいときは、主治医または薬剤師におたずねください。