


くすりのしおり

2004年8月作成

この薬の名前は	<ul style="list-style-type: none"> 商品名:メイアクト MS 小児用細粒 英名:Meiact MS Fine Granules 一般名:セフジトレン ピボキシル 	剤形:細粒 細粒の色:だいたい色 (芳香があり、味は甘くわずかな苦みを有する) シート裏面の記載:  M-23
この薬の働きは	<ul style="list-style-type: none"> 病気の原因となる細菌を殺す働きがあります。 	
主治医に伝え忘れたことはありませんか	<ul style="list-style-type: none"> 次のような人は使用前に主治医に相談してください。 以前に薬を飲んで発疹などが出たことのある人、気管支喘息、発疹、蕁麻疹等のアレルギー一症状を起こしやすい人、または、両親兄弟にそのような人がいる場合、腎臓の病気のある人 ほかに薬を使っている場合（薬局で買った薬も） その薬について主治医に伝えてください。 妊娠または授乳中の場合 主治医にそのことを必ず伝えてください。 	
この薬の使い方	<ul style="list-style-type: none"> 飲み方 使用時まで開封しないでください。開封後は、速やかにお飲みください。 水、ジュース等に混ぜて飲まれる場合は放置せず、すぐにお飲みください。 混ぜたものは保存しないでください。 飲み忘れた場合 気がついた時、できるだけ早く1回分を飲んでください。あとは指示通りの時間に飲んでください。 絶対に2回分を1度に飲んではいけません。 あやまって多く飲んだ場合 すぐに主治医または薬剤師に相談してください。 その他 主治医の指示なしに、自分の判断で飲むのをやめないでください。 	
生活上の注意	<ul style="list-style-type: none"> 光と湿気を避けて保存し、服用時に開封するようにしてください。 	
この薬をのんだあと気をつけていただくこと（副作用）	<ul style="list-style-type: none"> 薬は人によって、目的の効果以外に、望ましくない作用が出る場合もあります。 ◆次のような症状に気づいたら、使用をやめて、すぐに主治医に相談してください。 不快な感じがする、口の中がピリピリする、息をするときヒューヒュー音がする、めまいがする、急に大便をしたくなる、耳鳴りがする、冷や汗がでる、おなかが痛い、下痢がひどい、便に血が混じる、熱がでる、体がだるい、関節が痛い、頭が痛い、皮ふが赤くはれて発しん・ただれ・水ぶくれができる、皮ふがやけどのようになる、体がむくむ、尿がでにくい、せきがでる、呼吸が苦しい、血尿が出る、尿の量が減る、体や足がむくむ、目のはれぼったい、のどの痛み、口内炎、動悸、息切れ、疲れやすい、顔やまぶたの下が白っぽい、食欲がない、便秘、手足の冷え、爪が薄くなり中央にくぼみができる、皮膚や白目が黄色くなる、かゆみ、皮ふが赤くなる(押すと色は消える)。 ◇次のような症状に気づいたら、なるべく早めに主治医に相談してください。 発疹、蕁麻疹(じんましん)、皮ふが赤くなる、下痢をする、便が軟らかい、胃が不快な感じ、おなかがはる感じ、はきけがする、吐く、口の中が赤くなり痛む、口の中のただれ、出血しやすい、舌のはれ・痛み、舌が白くなる、しびれ。 ・他にも何か変だと感じたら、主治医または薬剤師に相談してください。 	
その他（コメント）		
主治医の連絡先		薬局の連絡先

*ここには、知っておいて頂きたい主な事柄だけが書いてあります。更にくわしく知りたいときは、主治医または薬剤師におたずねください。