

くすりのしおり [鎮痛・消炎用]

2003年10月改訂

<p>この薬の名前は</p> 	<p>・商品名：ボルタレン錠 ・英語名：Voltaren ・一般名：ジクロフェナクナトリウム</p>	<p>剤形(直径mm)：錠剤(7.1) 錠剤の色：淡黄赤色 シート裏面の記載：ボルタレン25mg CG301</p>	
<p>この薬の作用は</p> 	<p>・炎症やはれ、筋肉や関節の痛みを軽くします ただし、病気の原因そのものをなおすものではありません。 ・熱を下げる作用があります。</p>		
<p>主治医に伝え忘れたことはありませんか</p> 	<p>・次のような人は使う前に主治医に相談してください。 ・以前に薬で発疹やぜん息が出たことのある人、重い心臓、肝臓、じん臓、血液の病気のある人、胃腸のかいようのある人、ぜん息のある人、重い高血圧症のある人、インフルエンザ・水痘（みずぼうそう）のある子供 ・ほかに薬を使っている場合（薬局で買った薬も） その薬について主治医に伝えてください。 ・妊娠または授乳中の場合 主治医にそのことを必ず伝えてください。</p>		
<p>この薬の使い方</p> 	<p>・飲み方 必ず指示に従い、飲むときはコップ1杯の水またはぬるま湯といっしょに飲んでください。空腹時や寝る直前に飲むのはさけてください。 ・飲み忘れた場合 気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばしてください。 絶対に2回分を1度に飲んではいけません。 ・あやまって多く飲んだ場合 すぐに主治医または薬剤師に相談してください。 ・高齢者の場合 特に主治医の指示を守って使用してください。 ・その他 主治医の指示なしに自分の判断で飲むのをやめないでください。</p>		
<p>生活上の注意</p> 	<p>・めまいやねむ気、目のかすみが起こった場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作などは行わないでください。 ・タバコ、飲酒、コーヒー類はこのくすりの胃腸障害を強めるおそれがありますので、量をひかえるようところがけてください。</p>		
<p>この薬を飲んだあと気をつけていただくこと（副作用）</p>	<p>・薬は人によって、目的の効果以外に、望ましくない作用が出る場合もあります。 次のような症状に気づいたら、使用をやめて、すぐに主治医に相談してください。 顔が赤く熱くなる・くちびるや舌や手足がしびれる・気分が悪い・心臓がドキドキする・尿意や便意を生じる・息苦しい・目の前が暗くなる、冷や汗がでる・手足が冷たくなる、空腹時にみぞおちが痛い・血を吐いたり黒い便がでる、重いかぜのような症状（高熱、しつこいのどの痛みなど）、手足に赤い斑点やあざができる・出血しやすい・体がだるい・顔色が悪い・立ちくらみ、尿が赤くなる、発疹・くちびるや口内がある・目が充血する、皮ふが焼けるように熱く感じる・水ぶくれができる・皮ふが痛い、全身の皮ふが赤くなる・皮ふのカスがポロポロ落ちる、顔や手がむくむ・尿の量が減る、ひどく息苦しい・息をするとのががヒューヒュー鳴る、息切れがする・から咳がでる・発熱、足がむくむ・めまい・動悸・体がだるい、ひどく頭が痛む・首の後ろが固くなる・高い熱がでる、体がだるい・食欲がない・皮ふや白目が黄色くなる、ひどくおう吐する・意識がもうろうとする・けいれんが起こる、手足がしびれる・手足に力はいらない・筋肉が痛んだりこわばったりする・体がだるい・尿が赤黒くなる 次のような症状に気づいたら、なるべく早めに主治医に相談してください。 胃が痛む、おう吐する、血尿がでる、顔や足がむくむ、けいれんが起こる、手がふるえる、目がかすむ、耳鳴りがする、発疹、皮ふがかゆい ・他にも何か変だなと感じたら、主治医または薬剤師に相談してください。</p>		
<p>その他（コメント）</p>	<p>・服用する際は、PTPシートから取り出して飲んでください。</p>		
<p>主治医の連絡先</p>	<p>薬局の連絡先</p>	<p>☎</p>	

*ここには、知っておいて頂きたい主な事柄だけが書いてあります。更にくわしく知りたいときは、主治医または薬剤師におたずねください。