

医療安全通信 第68号-1

【薬局部医療安全委員会】

医療安全推進のため、Pharma Bridgeを通じて、医療安全上の周知すべき情報やタイムリーな話題を随時発信いたします。業務手順書の書換えや日常業務にお役立てください。

「ザイティガ錠」と「ザルティア錠」の 販売名類似による取り違えについて(1)

PMDA（医薬品医療機器総合機構）より、「製薬企業からの医薬品の安全使用（取り違え等）に関するお知らせ」が紹介されています。

<https://www.pmda.go.jp/files/000231368.pdf>

【ザイティガ錠/ザルティア錠の薬効、用法・用量の違い】

| 販売名 (一般名) | ザイティガ錠 250mg (アピラテロン酢酸エステル) | ザルティア錠 2.5mg ザルティア錠 5mg (タダラフィル) |
|---------------|--------------------------------|--|
| 薬効 | 前立腺癌治療剤 | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 |
| 用法 ・ 用量 | 通常1日1回 4錠 | ザルティア錠 2.5mg 通常1日1回 2錠 ザルティア錠 5mg 通常1日1回 1錠 |
| | 必ず空腹時服用 | — |
| | プレドニゾン併用必須 | — |

いずれも泌尿器科用薬で、販売名が類似していることから、2014年9月より取り違えに関する注意喚起が行われており、医療安全通信第40号（2017年10月4日配信）でもお知らせしました。2019年7月末までに [18件の処方間違い・薬剤取り違え事例](#) が報告されています。報告された事例の中には、適切な処方監査により患者への誤投与が未然に防止された事例も報告されており、これらの薬剤を調剤する際には、**販売名、薬効、用法・用量等をしっかりと確認しましょう。**


◆ 事例1

泌尿器科から発行された処方箋を調剤薬局が受けた。処方内容は、
Rp 1. **ザイティガ錠 250mg 1錠** 分1 × 14日分 **朝食後服用**
Rp 2. 【般】セフジニルカプセル100mg 3カプセル 分3 × 7日分 毎食後服用
であった。**プレドニゾンの併用は行われておらず**、また、投与量も250mgと通常の1/4の投与量となっているため、処方医に疑義照会を行った。処方内容を
Rp 1. ザルティア錠5mg 1錠 分1 × 14日分 朝食後服用
に変更するとの回答を得た。

◆ 事例2

前医より前立腺癌疑いで当院受診。精査の結果、前立腺肥大症と診断され、前立腺肥大症の治療が継続された。当院における治療開始約半年後、効果不足にてザルティア錠を追加処方するつもりで、ザイティガ錠を処方してしまった。処方17日後に処方間違いに気づき、患者に連絡し服用中止。採血等の検査をするも特に異常なし。
当院の処方オーダーリングシステムでは、**ザイティガ錠**には「**(腫)**」の文字が付加されているが、医師は気付くことができなかった。





医療安全通信 第68号-2

【薬局部医療安全委員会】

**「ザイティガ錠」と「ザルティア錠」の
販売名類似による取り違えについて（2）**

初めて処方される場合や、継続使用で別の医療機関から処方された際には、現在の症状や病歴、薬歴等の確認をしっかりと行い、処方時の薬剤の選択ミスや調剤時の取り違えによる誤投与を未然に防止しましょう。

処方鑑査時、調剤時、薬剤交付時に

- ザイティガ錠が処方されている際には、プレドニゾンが併用されていることを確認する。
- 販売名と用法・用量が合っているか確認する。
- 患者へのインタビューにより、どのような疾患で受診したかを確認する。
- 併用薬、病名などの情報を利用し、前回の処方歴および薬歴との照合をする。

**治療中の疾患と処方内容について疑問が生じた場合、
疑義照会を行ってください。**

新しく配属になった職員をはじめ全職員に対して、「ザイティガ錠」と「ザルティア錠」の両薬剤を間違えやすい医薬品として認知する機会（研修等）を設ける等、「調剤時の薬剤取り違え注意」および「薬剤選択ミスによる誤投薬防止」の啓発と周知を行います。

「ザイティガ錠」と「ザルティア錠」の販売名・薬効等を記載した表（右図）を、調剤を行う際の参考として、薬局内に掲示する等、活用してください。FAX送信では、表の画像が不鮮明になりますので、各自、WEBより印刷してください。

<https://www.pmda.go.jp/files/000231368.pdf>

これまでに発信された「製薬企業からの医薬品の安全使用（取り違え等）に関するお知らせ」は以下より確認できますので、併せて参考にしてください。

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medical-safety-info/0178.html>

| 医療事故防止対策の強化に関するお願い | | | |
|---|---|---|---|
| ザイティガ錠とザルティア錠を間違えて処方・調剤・交付された事例が報告されています。これらの薬剤を処方又は調剤いただく際には、 販売名、薬効、用法・用量 等をご確認ください。 | | | |
| | ザイティガ錠 250mg | ザルティア錠 2.5mg ザルティア錠 5mg | |
| 一般名 | アピラテロン酢酸エステル | タダラフィル | |
| 薬効 | 前立腺 癌治療剤 | 前立腺肥大症に伴う 排尿障害改善剤 | |
| 用法・用量 | 通常、1日1回 4錠  | ザルティア錠 2.5mg 通常、1日1回 2錠  | ザルティア錠 5mg 通常、1日1回 1錠  |
| | 必ず空腹時服用 | | — |
| | プレドニゾン併用必須 | — | |
| お問い合わせ先 | ヤンセンファーマ株式会社 ヤンセンコールセンター TEL：0120-183-275 FAX：0120-275-831 受付時間：9:00～17:40 （土・日・祝日及び当社休日を除く） | 日本新薬株式会社 くすり相談窓口 フリーダイヤル：0120-321-372 TEL：075-321-9064 FAX：075-321-9061 受付時間：9:00～17:30 （土・日・祝日を除く） | |